

Potilaan materiaalit

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Isotretinoin

Potilaan muistutuskortti

Lääkärin nimi:

Puhelinnumero:

Isotracin (isotretinoin) -valmisteita ei saa käyttää raskauden aikana.

Isotretinoinia sisältävät valmisteet voivat aiheuttaa vakavaa haittaa sikiölle, jos odottava äiti käyttää sitä.

Jos tulet raskaaksi tai epäilet olevasi raskaana, lopeta isotretinoin -valmisteen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.

Lue pakkausseloste huolellisesti ennen hoidon aloittamista.

Jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita isotretinoinia sisältävän valmisteen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Toimi näin, jos olet nainen, joka voi tulla raskaaksi:

Sinun on käytettävä vähintään yhtä erittäin tehokasta ehkäisymenetelmää (kuten ehkäisykierukkaa tai -implantaattia) tai kahta tehokasta eri tavoin toimivaa ehkäisymenetelmää (kuten ehkäisytabletteja ja lisänä kondomia) oikealla tavalla ennen hoitoa, hoidon aikana ja kuukauden ajan hoidon päätyttyä.

- **Et saa tulla raskaaksi** isotretinoinia sisältävän valmisteen käytön aikana etkä kuukauteen hoidon päätyttyä.
- **Sinun on käytävä säännöllisesti seurantakäynneillä ja raskaustesteissä:**
 - Sinun on käytävä raskaustestissä ennen hoidon aloittamista, ja raskaustestin tuloksen on oltava negatiivinen

- Sinun on käytävä raskaustesteissä hoidon aikana (mieluiten kuukausittain), jotta hoidon aikainen raskaus voidaan sulkea pois. Sinun on käytävä vielä viimeisessä raskaustestissä kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä.

Muistutus miehille ja naisille

Tämä lääke on määrätty vain sinulle.

Sitä ei saa antaa muiden käyttöön. Palauta käyttämättömät kapselit takaisin apteekkiin.

Sinun on käytettävä vähintään yhtä erittäin tehokasta ehkäisymenetelmää (kuten ehkäisykierukkaa tai